


QUELS SONT LES PRICIPAUX EFFETS SECONDAIRES ?

SPECTRE DES EILI POTENTIELS SOUS IMMUNOTHÉRAPIE :



PRINCIPAUX SYMPTÔMES / MANIFESTATIONS NÉCESSITANT UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE :

SYSTÈME	SYMPTÔMES
Nerveux	Céphalées, confusion, faiblesse musculaire, engourdissement
Endocrinien	Asthénie, perte de poids, nausées, vomissements, augmentation de l'appétit ou de la soif, polyurie
Respiratoire	Toux, souffle court
Digestif	Diarrhée, sang ou mucus dans les selles, douleur abdominale sévère
Cutané	Rash étendu, prurit sévère
Musculo-squelettique	Arthralgie, myalgie, douleurs articulaires
Signes généraux et autres symptômes	Fièvre, syndrome hémorragique, perte de vision importante d'un ou des deux yeux

SERVICE HDJ : ☎/...../...../...../.....



J'ACCÈDE À LA PLATEFORME
www.parcoursonco.fr




MÉDECIN TRAITANT / PHARMACIEN

Votre patient est actuellement traité par immunothérapie anti-cancéreuse.

Voici quelques points de repères pour une meilleure prise en charge.

QU'EST-CE QUE C'EST ?

MODE D'ACTION DES IMMUNOTHÉRAPIES CONTRE LE CANCER



L'**immunothérapie** n'agit pas directement sur les cellules tumorales mais cible le système immunitaire des patients pour le rendre apte à éliminer les cellules cancéreuses. Elle a pour objectif de stimuler la réponse anti-tumorale du système immunitaire générée par l'intermédiaire des lymphocytes T (LT).

FR-FPH-00063 - Avril 2019

COMMENT SE DÉROULE LE TRAITEMENT ?

SÉANCES ET INTERCURES

Le jour et l'heure de la première séance de traitement sont communiqués au patient par l'équipe soignante. Lors de cette première séance en HDJ, le patient bénéficie d'une attention particulière de l'équipe soignante de sorte à appréhender les lieux et le fonctionnement de l'HDJ. Un certain nombre de brochures et documents lui sont remis.

Les séances pourront être réalisées en :

-  **HOSPITALISATION DE JOUR**
-  **HOSPITALISATION COMPLÈTE**
-  **HOSPITALISATION À DOMICILE**

AVANT LES SÉANCES


 Un bilan biologique sera à réaliser avant chaque séance.

 Les résultats, transmis par le laboratoire d'analyses médicales, seront contrôlés par l'équipe de l'HDJ. Suivant les résultats du bilan biologique, la prise en charge sera adaptée.

SUIVI ENTRE LES CURES

Les immunothérapies peuvent être à l'origine d'effets indésirables (EILI). Il est important d'apprendre à reconnaître ces EILI dès l'instauration des cures d'immunothérapie et de les prendre en charge le plus rapidement possible au cours du traitement.

PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE



QUELLE CONDUITE À TENIR LORS DE LA SURVEILLANCE DES PATIENTS ?

Les effets indésirables liés aux immunothérapies peuvent apparaître à tout moment, parfois tardivement et même après l'arrêt du traitement, incitant à une surveillance régulière du patient. Une identification précoce de ces effets indésirables et une prise en charge rapide et adaptée sont essentielles pour limiter leur durée et leur sévérité, et pour prévenir le risque de lésions potentiellement définitives. Cela permettra de maintenir le traitement dans les conditions les plus favorables. Ainsi, il est important de signaler aux équipes d'oncologie qui suivent votre patient tout nouveau symptôme ou toute manifestation inhabituelle. Par ailleurs, nous vous alertons sur le fait que la prescription d'une corticothérapie à forte dose n'est pas recommandée en raison de l'existence d'un risque d'interactions pharmacodynamiques avec le traitement par immunothérapies.

MESSAGES CLÉS À DESTINATION DES PATIENTS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ :

