

# VENIR POUR UNE ENTORSE

## REPARTIR VACCINÉ(E) CONTRE PLUSIEURS CANCERS DU HPV-INDUITS\*.

### Arbre décisionnel en cas d'interruption du schéma vaccinal par GARDASIL® 9

Pour la prescription et l'administration de ce vaccin,  
se référer à la réglementation en vigueur (Journal Officiel du 09/08/23).

#### \* Indications<sup>1</sup>

GARDASIL® 9 est indiqué pour l'immunisation active des individus à partir de 9 ans contre les maladies dues aux HPV suivantes :

- Lésions précancéreuses et cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et de l'anus dus aux types d'HPV contenus dans le vaccin.

- Verrues génitales (condylomes acuminés) dues à des types d'HPV spécifiques.

GARDASIL® 9 doit être utilisé selon les recommandations officielles.

#### Place dans la stratégie thérapeutique<sup>2</sup>

GARDASIL® 9 peut être utilisé selon son AMM dans le cadre des recommandations vaccinales en vigueur pour les populations suivantes :

- toutes les filles et tous les garçons de 11 à 14 ans révolus<sup>#</sup>, avec un rattrapage possible pour tous les adolescents et jeunes adultes (hommes et femmes) de 15 à 19 ans révolus<sup>§</sup> ;
- les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

#### Recommandations générales du calendrier vaccinal<sup>3</sup>

- Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin GARDASIL® 9. Les vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination initiée avec un autre vaccin doit être menée à son terme avec le même vaccin.
- Concernant le cancer du col de l'utérus, la vaccination est un moyen de prévention en complément du dépistage recommandé chez les femmes de 25 à 65 ans.

Agréé aux collectivités. Remboursement sécurité sociale : 65 % selon les recommandations en vigueur.

<sup>#</sup> Soit la veille des 15 ans.

<sup>§</sup> Soit la veille des 20 ans.

  
**GARDASIL® 9**  
Vaccin Papillomavirus Humain 9-valent  
(Recombinant, adsorbé)



## DE 11 À 14 ANS RÉVOLUS<sup>#</sup>

Filles + garçons

### Schéma en 2 doses




La 2<sup>ème</sup> dose doit être administrée dans un intervalle entre 6 et 13 mois après la 1<sup>ère</sup>

## EN RATTRAPAGE DE 15 À 19 ANS RÉVOLUS<sup>\$</sup>

Filles + garçons

### Schéma en 3 doses




2<sup>ème</sup> dose au moins 1 mois après la 1<sup>ère</sup> 3<sup>ème</sup> dose au moins 3 mois après la 2<sup>ème</sup> Les 3 doses doivent être administrées dans une période maximale d'un an

Le schéma 3 doses est également recommandé chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

# ARBRE DÉCISIONNEL EN CAS D'INTERRUPTION DU SCHÉMA VACCINAL PAR GARDASIL® 9 2-5

## COMMENT COMPLÉTER LE SCHÉMA VACCINAL DE VOTRE PATIENT ?

Quel que soit l'âge actuel de votre patient(e), vous pouvez reprendre le schéma vaccinal initial normal indépendamment de la durée d'interruption



HSH : hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes

<sup>#</sup> 14 ans révolus, soit jusqu'à la veille des 15 ans

<sup>\$</sup> 19 ans révolus, soit jusqu'à la veille des 20 ans

<sup>‡</sup> ou de 20 à 26 ans pour les HSH

\* Respecter l'espacement entre les doses selon le schéma vaccinal de GARDASIL® 9.

\*\* Si possible, réaliser des sérologies vaccinales ciblées pour certaines valences pour éviter l'administration de doses vaccinales inutiles.<sup>5</sup>

## Bon usage GARDASIL® 9 1

### Contre-indications :

- **Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients du vaccin** listés dans la rubrique 6.1 du RCP.
- **Hypersensibilité après une administration antérieure de GARDASIL® 9 ou du vaccin qHPV (GARDASIL®).**

### Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

- **Traçabilité : enregistrer** le nom et le numéro de lot du produit administré.
- **Décision de vacciner un sujet :** doit tenir compte du risque d'exposition antérieure au HPV et du bénéfice potentiel de la vaccination.
- **Rares réactions anaphylactiques pouvant survenir après l'administration du vaccin :** disposer d'un traitement médical approprié et assurer une surveillance du sujet.
- **Syncope (évanouissement), parfois associée à des chutes avant ou après vaccination en particulier chez les adolescents, comme réaction psychogène à l'injection avec une aiguille.**  
Suivi pendant environ 15 minutes après la vaccination afin d'éviter toute blessure en cas d'évanouissement.
- **Maladie fébrile aiguë sévère :** différer la vaccination.
- **Maladies sexuellement transmissibles :** Mesures de précaution appropriées à poursuivre.
- **Le vaccin est utilisé uniquement en prévention** et n'a pas d'effet(s) thérapeutique(s) et/ou curatif(s) sur les infections, lésions et/ou cancers qu'elles soient avérées et/ou en cours de développement. Le vaccin ne remplace en aucun cas le dépistage de routine.
- **Sujets avec une réponse immunitaire altérée :** aucune donnée.
- **Immunodéprimés :** peuvent ne pas répondre au vaccin.
- **Sujets présentant une thrombocytopénie ou tout trouble de la coagulation :** prudence : saignement possible suite à une administration par voie intramusculaire.
- **Interchangeabilité de GARDASIL® 9 avec des vaccins HPV bivalent ou quadrivalent :** aucune donnée de tolérance, d'immunogénicité ou d'efficacité disponible.
- **Sodium : Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».**

### Grossesse et allaitement :

- **Grossesse :** Les données sont considérées comme insuffisantes pour recommander l'utilisation de GARDASIL® 9. La vaccination doit être reportée après le terme de la grossesse.
- **Allaitement :** GARDASIL® 9 peut être administré chez la femme allaitante.
- **Fertilité :** Aucune donnée chez l'homme.

### Effets indésirables :

- **Très fréquents (≥ 1 /10) :** Céphalées. Au site d'injection : douleur, gonflement, érythème.
- **Fréquents (≥ 1 /100 à < 1 /10) :** Nausées, fièvre, fatigue, sensations vertigineuses. Au site d'injection : prurit, ecchymose.
- **Rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) :** Hypersensibilité.

Pour plus d'information sur les effets indésirables peu fréquents ou de fréquence indéterminée, consultez le RCP.

**Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr>.**



Avant de prescrire ou d'administrer,, pour des informations complètes, veuillez consulter le RCP disponible en flashant ce QR code ou directement sur le site internet : <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

Avant de prescrire ou d'administrer,, consulter la place de GARDASIL® 9 recommandée par le Haut Conseil de Santé Public (HCSP) sur le site [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr). Votre délégué médical est à votre disposition pour vous remettre les mentions obligatoires complètes de GARDASIL® 9 au format papier ou électronique.

## Références

1. Résumé des Caractéristiques du Produit GARDASIL® 9.
2. Haute Autorité de Santé - Avis de la Commission de la Transparence GARDASIL® 9 du 19 février 2020 – Disponible en ligne sur : [https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-17461\\_GARDASIL9\\_PIC\\_REEV\\_AvisDef\\_CT17461&17456.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-17461_GARDASIL9_PIC_REEV_AvisDef_CT17461&17456.pdf)
3. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur disponible en ligne sur : <https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal> - Consulté le : 17/04/2023.
4. HAS. Recommandation vaccinale. Rattrapage vaccinal en population générale Statut vaccinal inconnu, incomplet ou incomplètement connu Décembre 2019.
5. HAS. Recommandation vaccinale. Rattrapage vaccinal en situation de statut vaccinal incomplet, inconnu, ou incomplètement connu En population générale et chez les migrants primo-arrivants. Décembre 2019.



LE TRI  
+ FACILE

